

BTS CHIMIE 1998

EXERCICE 1

Deux filiales d'une même entreprise fabriquent des piles de 9 volts. On admet que les durées de vie moyennes des piles issues des filiales A et B suivent des lois de probabilité d'espérances mathématiques respectives μ_A et μ_B .

Dans la production de la filiale A , on a prélevé un échantillon de 55 piles et on a consigné dans le tableau ci-dessous les résultats concernant leur durée de vie :

durée de vie (en heures)	[75; 77[[77; 79[[79; 81[
Nombre de piles	7	8	3						
				[81; 83[[83; 85[[85; 87[[87; 89[[89; 91[[91; 93[
				7	7	4	5	5	9

En ce qui concerne la filiale B , on a testé un échantillon de 75 piles et on a obtenu les statistiques suivantes : durée de vie moyenne $m_2 = 81 h$, écart-type correspondant $\sigma_2 = 4,5 h$.

- 1) Déterminer à 10^{-1} près, la durée de vie moyenne m_1 et l'écart-type correspondant σ_1 pour l'échantillon prélevé dans la production de la filiale A . (Pour ce calcul, on supposera que les effectifs sont concentrés au centre des classes).
- 2) Trouver les estimations ponctuelles m_A et m_B de la durée de vie moyenne des piles fabriquées par les filiales A et B , à 10^{-1} près et les estimations ponctuelles σ_A et σ_B des écarts-types correspondants. On justifiera les résultats.
- 3) On se pose la question de savoir si la différence des moyennes des durées de vie observées dans les deux échantillons est imputable à une meilleure fabrication dans l'une des deux filiales ou tout simplement à des fluctuations d'échantillonnage. Dans ce but, on construit un test unilatéral.

On note \bar{X}_A la variable aléatoire prenant pour valeur la durée de vie moyenne d'une pile dans un échantillon de taille 55 provenant de la filiale A .

On note \bar{X}_B la variable aléatoire prenant pour valeur la durée de vie moyenne d'une pile dans un échantillon de taille 75 provenant de la filiale B .

On admet que : \bar{X}_A suit la loi normale de moyenne μ_A et d'écart-type $\frac{\sigma_A}{\sqrt{55}}$, \bar{X}_B suit la loi normale de moyenne μ_B et d'écart-type $\frac{\sigma_B}{\sqrt{75}}$.

\bar{X}_A et \bar{X}_B sont des variables aléatoires indépendantes.

On pose $D = \bar{X}_A - \bar{X}_B$ et on admet que D suit une loi normale.


- a) Calculer l'écart-type de D .
- b) On pose comme hypothèse nulle $H_0 : \langle \mu_A = \mu_B \rangle$ et comme hypothèse alternative $H_1 : \langle \mu_A > \mu_B \rangle$.

Calculer, sous l'hypothèse H_0 , le nombre h tel que : $P(D < h) = 0,95$.

- c) Énoncer la règle de décision relative à ce test lorsqu'on choisit un seuil de signification de 5% et conclure.

EXERCICE 2

On étudie des réactions chimiques au cours desquelles un corps A subit des transformations selon le schéma suivant :



k_1, k_2, k_3, k_4 sont des constantes de vitesse.

On note $x(t), y(t), z(t)$ les concentrations respectives des produits A, B, C à un instant t donné (t exprimé en minutes). Les conditions initiales sont $x(0) = 1, y(0) = 0$ et $z(0) = 0$.

On dispose au dessus de la cuve où a lieu la réaction une burette par laquelle on verse du produit A à une vitesse constante dans la cuve. Dans ces conditions initiales expérimentales, les fonctions x, y, z définies sur l'intervalle $[0; +\infty[$ vérifient le système différentiel suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 - 2x + y + z \\ \frac{dy}{dt} = x - y \\ \frac{dz}{dt} = x - z \end{cases}$$

Partie A

1) a) Calculer $\frac{d}{dt}(x + y + z)$ et, à l'aide des conditions initiales, en déduire que $y(t) + z(t) = 1 + t - x(t)$.

b) Démontrer que x est solution de l'équation différentielle (E) : $\frac{dx}{dt} + 3x = 2 + t$

2) a) Déterminer une fonction affine x_0 solution de l'équation (E).

b) Résoudre alors l'équation (E).

c) Déterminer une solution particulière x_1 de l'équation (E) vérifiant la condition initiale $x_1(0) = 1$.

3) Démontrer que $\frac{d}{dt}(y - z) + y - z = 0$, et en déduire que $y = z$.

Des questions précédentes déduire l'expression de $y(t)$ et $z(t)$.

Partie B

On considère maintenant la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par

$$f(t) = \frac{5}{9} + \frac{1}{3}t + \frac{4}{9}e^{-3t}$$

On désigne par \mathcal{C} sa courbe représentative dans un repère orthonormal (unité graphique 5 cm).

1) Calculer $f'(t)$ et étudier les variations de la fonction f en justifiant clairement l'étude du signe de la dérivée.

2) Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$. Démontrer que la droite \mathcal{D} d'équation $y = \frac{1}{3}t + \frac{5}{9}$ est asymptote à la courbe \mathcal{C} . Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote.

3) Représenter dans le même repère orthonormal (d'unité 5 cm) la courbe \mathcal{C} , son asymptote \mathcal{D} et sa tangente au point d'abscisse 0.

Partie C

Préciser alors, à l'aide des résultats des parties A et B, à partir de quel instant α on aura retrouvé la concentration initiale en produit A . (On donnera α à la seconde près).